GEBRAUCHSINFORMATION

SIC! SALTS 10 mg
Liquid für E-Zigaretten

ACHTUNG
Vor dem Gebrauch die Packungsbeilage lesen. Die Packungsbeilage und den Karton nicht wegwerfen.

VERWENDUNGSHINWEISE
Die Flüssigkeit im Füllbehälter dient zum Auffüllen der Kassette/des Behälters von E-Zigaretten. Der Füllbehälter ist mit einem Kinderschutzmechanismus gesichert. Zum Öffnen bitte den Deckel nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Kassette/den Behälter der E-Zigarette zu füllen, bitte den Schnabel des Füllbehälters in die entsprechende Öffnung der Kassette/des Behälters der E-Zigarette schieben und die gewünschte Menge durch einen leichten Druck auf die Flasche einfüllen. Anschließend den Füllbehälter wieder schließen: hierzu den Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn zudrehen. Schnabelbreite: 2,68 +/- 0,5 mm.

WARNUNGEN
Das Produkt ist nicht für Schwangere und/oder stillende Mütter, Personen unter 18 Jahren, bei Allergien gegen einen der Bestandteile sowie bei Kreislauferkrankungen geeignet. Die Verwendung ist nicht für Nichtrauchern empfohlen. Darf nicht in

die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

LAGERUNG

An einem dunklen und trockenen Ort lagern. Bei einer Temperatur von 10-25 °C lagern.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Trockenheit im Mundbereich, Hals und Nase, Kopfschmerzen. Sollten andere Nebenwirkungen auftreten, bitten wir um Kontaktaufnahme per **E-Mail: info@malbat.de**

SUCHTFÖRDERNDE EIGENSCHAFTEN

Enthält: Nikotinbenzoat, Nikotinmalat. Nikotin ist eine giftige Substanz. Nikotin macht abhängig.

TOXIZITÄT

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Giftig bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Toxikologische Daten für reines Nikotin: LD50-ATE-Wert: 5 mg/kg (oral); 70 mg/kg (dermal); 0,19 mg/l (inhalativ).

GEFAHR



Hergestellt in der EU.

VERTEILER:

Chemnovatic Sp. z o.o.
Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, Polen
office@chemnovatic.com
tel: +48 81 475 44 42

VERTRIEBSKONTAKT:

Malbat
Info@malbat.de, +49 511 64661586

GEBRAUCHSINFORMATION

SIC! SALTS 20 mg
Liquid für E-Zigaretten

ACHTUNG
Vor dem Gebrauch die Packungsbeilage lesen. Die Packungsbeilage und den Karton nicht wegwerfen.

VERWENDUNGSHINWEISE
Die Flüssigkeit im Füllbehälter dient zum Auffüllen der Kassette/des Behälters von E-Zigaretten. Der Füllbehälter ist mit einem Kinderschutzmechanismus gesichert. Zum Öffnen bitte den Deckel nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Um die Kassette/den Behälter der E-Zigarette zu füllen, bitte den Schnabel des Füllbehälters in die entsprechende Öffnung der Kassette/des Behälters der E-Zigarette schieben und die gewünschte Menge durch einen leichten Druck auf die Flasche einfüllen. Anschließend den Füllbehälter wieder schließen: hierzu den Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn zudrehen. Schnabelbreite: 2,68 +/- 0,5 mm.

WARNUNGEN
Das Produkt ist nicht für Schwangere und/oder stillende Mütter, Personen unter 18 Jahren, bei Allergien gegen einen der Bestandteile sowie bei Kreislauferkrankungen geeignet. Die Verwendung ist nicht für Nichtrauchern empfohlen. Darf nicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

LAGERUNG

An einem dunklen und trockenen Ort lagern. Bei einer Temperatur von 10-25 °C lagern.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Trockenheit im Mundbereich, Hals und Nase, Kopfschmerzen. Sollten andere Nebenwirkungen auftreten, bitten wir um Kontaktaufnahme per E-Mail: biuro@tabascovape.pl

SUCHTFÖRDERNDE EIGENSCHAFTEN

Enthält: Nikotinbenzoat, Nikotinmalat. Nikotin ist eine giftige Substanz. Nikotin macht abhängig.

TOXIZITÄT

Giftig bei Verschlucken. Lebensgefahr bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Toxikologische Daten für reines Nikotin: LD50-ATE-Wert: 5 mg/kg (oral); 70 mg/kg (dermal); 0,19 mg/l (inhalativ).



GEFAHR

VERTEILER:
TABASCO VAPE SP. Z O.O.
Marcina Filipa 68/37
35-323 Rzeszów, Polen
+48 510 457 966
Daniel Tabas (Ansprechpartner)